Школьные задачи / Алгебра / А-64

При каких значения параметра a неравенство

$$|x| \cdot (|x| - 1 - 1) \geq a$$

выполняется при любом значении x ?

Решение

Проведём с неравенством равносильные преобразования:

$$\begin{aligned}
 |x| \cdot (|x| - 1 - 1) \geq a &\stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} \begin{cases} |x| - 1 \geq 0 \\ |x| \cdot (|x| - 1 - 1) \geq a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| \geq 1 \\ |x| \cdot (|x| - 2) \geq a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| \geq 1 \\ (|x|)^2 - 2|x| \geq a \end{cases} \Leftrightarrow \\
 &\begin{cases} |x| - 1 < 0 \\ |x| \cdot (-(|x| - 1) - 1) \geq a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| < 1 \\ |x| \cdot (-|x| + 1 - 1) \geq a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| < 1 \\ -(|x|)^2 \geq a \end{cases} \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow \begin{cases} |x| \geq 1 \\ x^2 - 2|x| \geq a \end{cases} \stackrel{(2)}{\Leftrightarrow} \begin{cases} x \geq 1 \\ x \leq -1 \\ x^2 - 2|x| \geq a \end{cases} \stackrel{(3)}{\Leftrightarrow} \begin{cases} x \geq 1 \\ x \leq -1 \\ x^2 + 2x \geq a \end{cases} \stackrel{(4)}{\Leftrightarrow} \begin{cases} x \geq 1 \\ x \leq -1 \\ x^2 + 2x + 1 - 1 \geq a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ (x-1)^2 - (1+a) \geq 0 \\ x \leq -1 \\ (x+1)^2 - (1+a) \geq 0 \\ -1 < x < 1 \\ -x^2 \geq a \end{cases}
 \end{aligned}$$

В приведённых записях переход (1) представляет рассмотрение разных знаков подмодульного выражения $|x| - 1$. На стадии (2) расписано решение неравенства $|x| \geq 1$, этап (3) – замена системы из неравенства и объединения неравенств на объединение из двух систем. С перехода (4) выполняется выделение полного квадрата в неравенствах $x^2 - 2x \geq a$ и $x^2 + 2x \geq a$.

Далее удобнее рассмотреть каждую из трёх систем получившегося объединения по отдельности.

а) $x \geq 1$

При таких значениях переменной x исходное неравенство преобразуется к виду

$$(x - 1)^2 - (1 + a) \geq 0,$$

где левая его часть есть разность двух чисел: $(x - 1)^2$ и $(1 + a)$. В рассматриваемом случае ($x \geq 1$) уменьшаемое $(x - 1)^2$ всегда принимает значения большие или равные нулю. Значит, чтобы вся разность

$$(x - 1)^2 - (1 + a)$$

всегда была неотрицательной необходимо, чтобы вычитаемое $(1 + a)$ было меньше нуля или хотя бы равным ему:

$$1 + a \leq 0$$

Отсюда вытекает, что для $x \geq 1$ исходное неравенство будет выполняться в случае если

$$a \leq -1$$

б) $x \leq -1$

Здесь исходное неравенство может быть представлено как

$$(x + 1)^2 - (1 + a) \geq 0,$$

где слева стоит разность двух чисел: $(x + 1)^2$ и $(1 + a)$. Если $x \leq -1$, то уменьшаемое $(x + 1)^2$ всегда принимает значения большие или равные нулю. Значит, чтобы разность

$$(x + 1)^2 - (1 + a)$$

всегда была неотрицательной нужно потребовать, чтобы вычитаемое $(1 + a)$ было меньше или равно нулю:

$$1 + a \leq 0,$$

то есть если $x \leq -1$, то исходное неравенство будет гарантировано выполняться в случае, когда $a \leq -1$.

в) $-1 < x < 1$

В этом случае исходное неравенство можно преобразовать к виду

$$-x^2 \geq a$$

Из условия $-1 < x < 1$ вытекает, что

$$-1 < -x^2 \leq 0,$$

а также то, что неравенство $-x^2 \geq a$ (как и исходное неравенство) всегда будет справедливым, если $a \leq -1$.

Таким образом из рассмотренных рассуждений вытекает, что при $a \leq -1$ приведённое в условии задачи неравенство всегда будет справедливым для любых значений x .

О т в е т

$$a \leq -1$$

Комментарий

Задачу можно решить графически. Для этого следует построить график функции

$$y_1(x) = |x| \cdot (|x| - 1) - 1,$$

а затем определить, при каких значениях a точки $y_1(x)$ оказываются не ниже линии

$$y_2(x) = a$$

Ранее в задании А-63 рассматривалось построение графика функции

$$y_0(x) = 1 + |x| \cdot (|x| - 1) - 1$$

Если его «спустить вниз» на единицу (сдвинуть в сторону отрицательных значений ординат), то как раз получится график $y_1(x)$ (рис. 1), из которого видно, что все его точки не имеют ординат, меньших -1 . Отсюда напрямую вытекает ответ к задаче: $a \leq -1$.

Рис. 1.

© Широков Александр, 21.05.2025